

Académie :

Département :

3 – CONDUITE A TENIR EN CAS D’URGENCE – Partie médecin

Nom/Prénom :	Date de naissance :
Numéros d’urgence spécifiques éventuels autres que le 15 ou le 112 :	
Fiche établie pour la période suivante : .	

Dès les premiers signes, faire chercher la trousse d’urgence de l’enfant ainsi qu’un téléphone portable.

Evaluer la situation et pratiquer :

Signes d’appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements, diarrhée, fièvre	Appel des parents	Donner une ampoule de G30% puis voir avec les parents pour la suite de la prise en charge
Refus du repas		
Comportement inhabituel		/ !\ Ne pas donner de jus de fruit ni gâteau pour le resucrage

Dès les premiers signes de gravité ou si les signes précédents persistent : appeler le 15 ou le 112

Signes d’appel visibles	Mesures à prendre	Traitement
Vomissements itératifs	Appel 15 et parents.	En l’absence de trouble de conscience : donner 1 ampoule de glucosé 30%
Signes d’hypoglycémie (sueurs, pâleur, fatigue, tremblements...)	Préciser au SAMU que l’enfant est suivi pour une maladie métabolique à risque d’hypoglycémie	Transmettre le protocole d’urgence au SAMU
Trouble de conscience		

Dans tous les cas, ne pas oublier de tenir la famille informer.

Un courrier avec des informations médicales confidentielles sous pli cacheté à l’attention des services de secours peut être joint à cette fiche de conduite à tenir : Courier joint : OUI

Cachet du médecin :

Date :

Signature du médecin :